

Uitwerkingen voorbeeldtentamen 2 Wiskunde B 2018

Vraag 1a – 4 punten

Voor $x \neq 0$ geldt:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{-2 + 2\sqrt{x+1}}{x} \cdot \frac{1 + \sqrt{x+1}}{1 + \sqrt{x+1}} = \frac{2(-1 + \sqrt{x+1})(1 + \sqrt{x+1})}{x(1 + \sqrt{x+1})} = \frac{2(-1^2 + (\sqrt{x+1})^2)}{x(1 + \sqrt{x+1})} \\ &= \frac{2(-1 + x + 1)}{x(1 + \sqrt{x+1})} = \frac{2x}{x(1 + \sqrt{x+1})} = \frac{2}{1 + \sqrt{x+1}} = h(x) \end{aligned}$$

Alternatief:

$$f(x) = h(x) \Leftrightarrow \frac{-2 + 2\sqrt{x+1}}{x} = \frac{2}{1 + \sqrt{x+1}} \Leftrightarrow \frac{2(-1 + \sqrt{x+1})(1 + \sqrt{x+1})}{x} = 2 \Leftrightarrow \frac{2x}{x} = 2$$

Vraag 1b – 4 punten

Voor $x \neq 0$ geldt:

$$g(x) = \frac{4x^2 + x}{x} = 4x + 1$$

k : $y = 4x + 1$ met $x = 0$ geeft $y = 1$, en ook $h(0) = 1$.

De perforatie van zowel f als g is dus het punt $(0,1)$.

$$h'(x) = \frac{-\frac{2}{2\sqrt{x+1}}}{(1 + \sqrt{x+1})^2} = -\frac{1}{\sqrt{x+1} \cdot (1 + \sqrt{x+1})^2}$$

De helling van k is 4; de helling van h in $(0,1)$ is $h'(0) = -\frac{1}{4}$

Het product van deze hellingen is -1 , dus de beide grafieken snijden elkaar loodrecht.

Vraag 2a – 4 punten

$$\begin{aligned} f(p) - g(p) = \ln(4) &\Leftrightarrow \ln(9 - 2p) - \ln(3 - p) = \ln(4) \Leftrightarrow \ln\left(\frac{9 - 2p}{3 - p}\right) = \ln(4) \\ &\Leftrightarrow \frac{9 - 2p}{3 - p} = 4 \Leftrightarrow 9 - 2p = 4(3 - p) \Leftrightarrow 9 - 2p = 12 - 4p \Leftrightarrow 2p = 3 \Leftrightarrow p = \frac{3}{2} \\ g(p) - f(p) = \ln(4) &\text{ heeft geen oplossingen, zoals je in de grafiek kunt zien.} \end{aligned}$$

Vraag 2b – 7 punten

$$\begin{aligned} f'(x) &= -\frac{2}{9 - 2x}; \quad g'(x) = -\frac{1}{3 - x} \\ f(0) &= \ln(9); \quad f'(0) = -\frac{2}{9}; \quad g(0) = \ln(3); \quad g'(0) = -\frac{1}{3} \\ \text{De raaklijnen zijn dus } y &= -\frac{2}{9}x + \ln(9) \text{ en } y = -\frac{1}{3}x + \ln(3) \\ \text{Op te lossen: } -\frac{2}{9}x + \ln(9) &= -\frac{1}{3}x + \ln(3) \\ \text{Dit geeft } \frac{1}{9}x &= \ln(3) - \ln(9) \Leftrightarrow x = 9(\ln(3) - \ln(9)) \\ \text{Ofwel } x &= 9 \ln\left(\frac{3}{9}\right) = 9 \ln\left(\frac{1}{3}\right) = \ln(3^{-9}) = -9 \ln(3) \\ \text{De tweede, derde en vierde uitdrukking zijn alle drie OK.} \end{aligned}$$

Vraag 2c – 5 punten

$$\begin{aligned} f(x) = h(x) &\Leftrightarrow \ln(9 - 2x) = 2 \ln(x + 3) \Leftrightarrow \ln(9 - 2x) = \ln((x + 3)^2) \Leftrightarrow 9 - 2x = x^2 + 6x + 9 \\ \text{Hieruit volgt } x^2 + 8x &= 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = -8 \\ x = -8 &\text{ voldoet niet; } x = 0 \text{ geeft snijpunt } (0, \ln(9)) \end{aligned}$$

Vraag 2d – 7 punten

$$\begin{aligned} y = \ln(3 - x) &\Leftrightarrow e^y = 3 - x \Leftrightarrow x = 3 - e^y \\ \text{Te berekenen is dus } &\pi \cdot \int_0^{\ln(3)} (3 - e^y)^2 dy \\ \text{Een primitieve van } (3 - e^y)^2 &= 9 - 6e^y + e^{2y} \text{ is } G(y) = 9y - 6e^y + \frac{1}{2}e^{2y} \\ \text{De inhoud is zodoende } &\pi \cdot \left(9 \ln(3) - 6 \cdot 3 + \frac{1}{2} \cdot 9 - \left(0 - 6 + \frac{1}{2}\right)\right) = \pi(9 \ln(3) - 8) \end{aligned}$$

Vraag 3a – 6 punten

$\angle CBP = 90^\circ$, dus onze vriend Thales zegt dat het middelpunt van de cirkel door B , C en P het midden is van de schuine zijde PC van driehoek BPC . Dit is het punt $(-1, -\frac{1}{2})$

De vergelijking van de cirkel heeft dus de vorm $(x + 1)^2 + (y + \frac{1}{2})^2 = r^2$

Invullen van de coördinaten van B geeft $r^2 = (0 + 1)^2 + (4 + \frac{1}{2})^2 = 1 + 20\frac{1}{4} = 21\frac{1}{4}$
Je kunt uiteraard ook de coördinaten van C of P invullen.

Alternatief 1:

De middelloodlijn van B en C gaat door $(-2, 0)$ en heeft richtingscoëfficiënt $-\frac{1}{2}$
Want hij loopt evenwijdig aan de lijn door A en B .

De vergelijking van deze lijn is dus $y = -\frac{1}{2}(x + 2) \Leftrightarrow y = -\frac{1}{2}x - 1$

De middelloodlijn van B en P gaat door $(1, 3\frac{1}{2})$ en heeft richtingscoëfficiënt 2
Want hij loopt evenwijdig aan de lijn door B en C .

De vergelijking van deze lijn is dus $y - 3\frac{1}{2} = 2(x - 1) \Leftrightarrow y = 2x + 1\frac{1}{2}$

Het middelpunt van de cirkel is het snijpunt van deze middelloodlijnen.

Dit vinden we door op te lossen:

$$-\frac{1}{2}x - 1 = 2x + 1\frac{1}{2} \Leftrightarrow -2\frac{1}{2}x = 2\frac{1}{2} \Leftrightarrow x = -1, \text{ dus } y = -\frac{1}{2}$$

Berekening van de vergelijking verder als boven.

Alternatief 2:

Invullen van de coördinaten van $B(0,4)$, $C(-4, -4)$ en $P(2,3)$ in $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ geeft drie vergelijkingen in drie onbekenden waaruit a , b en r^2 opgelost kunnen worden.

Vraag 3b – 6 punten

De rechte lijn door $P(2,3)$ en $D(4, -8)$ heeft richtingscoëfficiënt $-\frac{11}{2}$.

De vergelijking is dus $y - 3 = -\frac{11}{2}(x - 2) \Leftrightarrow y = -\frac{11}{2}x + 14$

De lijn door C en Q staat loodrecht hierop en heeft dus richtingscoëfficiënt $\frac{2}{11}$.

De vergelijking van de lijn door $C(-4, -4)$ en Q is zodoende $y + 4 = \frac{2}{11}(x + 4) \Leftrightarrow y = \frac{2}{11}x - \frac{36}{11}$

Q is het snijpunt van deze twee lijnen, dus los op:

$$-\frac{11}{2}x + 14 = \frac{2}{11}x - \frac{36}{11} \Leftrightarrow -121x + 308 = 4x - 72 \Leftrightarrow -125x = -380 \Leftrightarrow x = \frac{76}{25}$$

$$\text{Hieruit volgt } y = -\frac{11}{2} \cdot \frac{76}{25} + 14 = -\frac{836}{50} + \frac{700}{50} = -\frac{136}{50} = -\frac{68}{25} \left(= \frac{2}{11} \cdot \frac{76}{25} - \frac{36}{11} = \frac{152}{275} - \frac{900}{275} = -\frac{748}{275} = -\frac{68}{25} \right)$$

Alternatieven:

Thales zegt dat Q op de cirkel uit vraag a ligt, dus bereken het snijpunt van deze cirkel met de lijn door P en D . Er zijn ook diverse uitwerkingen met de vectorvoorstelling van deze lijn mogelijk.

Vraag 3c – 6 punten

De projectie van P op zijde CD noemen we S , de projectie van Q op zijde CD noemen we T .
Merk op dat de driehoeken PSD en QTD gelijkvormig zijn.

De oppervlakte van driehoek CQD is $\frac{1}{2}|CD| \cdot |QT|$

Dit moet gelijk zijn aan $\frac{1}{3} \cdot |CD|^2$

Hieruit volgt $|QT| = \frac{2}{3}|CD|$

Vanwege de genoemde gelijkvormigheid volgt hieruit $|DQ| = \frac{2}{3}|DP|$.

Dit geeft: $\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{DQ} = \overrightarrow{OD} + \frac{2}{3} \cdot \overrightarrow{DP} = \begin{pmatrix} 4 \\ -8 \end{pmatrix} + \frac{2}{3} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$, dus $x_Q = 2\frac{2}{3}$ en $y_Q = -\frac{2}{3}$

Vraag 4a – 5 punten

$$f_1'(x) = 2x \cdot e^x + x^2 \cdot e^x$$

$$f_1''(x) = 2 \cdot e^x + 2x \cdot e^x + 2x \cdot e^x + x^2$$

$$f_1''(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 + 4x + 2 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-4 + \sqrt{8}}{2} = -2 + \sqrt{2} \vee x = \frac{-4 - \sqrt{8}}{2} = -2 - \sqrt{2}$$

Vraag 4b – 6 punten

$$f_a'(x) = 2x \cdot e^{ax} + x^2 \cdot a e^{ax}$$

$$f_a'(x) = 0 \Leftrightarrow ax^2 + 2x = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = -\frac{2}{a}$$

In het maximum geldt dus $x = -\frac{2}{a} \Leftrightarrow a = -\frac{2}{x}$

Invullen van $a = -\frac{2}{x}$ in $y = x^2 \cdot e^{ax}$ geeft $y = x^2 \cdot e^{-2}$

Vraag 4c – 7 punten

Als de grafiek van f_2 en de lijn $y = px$ elkaar raken, dan geldt: $f_2(x) = px$ en $f_2'(x) = p$

Dit geeft $x^2 e^{2x} = px$ en $2x e^{2x} + 2x^2 e^{2x} = p$

Dit combineert tot: $x^2 e^{2x} = (2x e^{2x} + 2x^2 e^{2x}) \cdot x \Leftrightarrow x^2 e^{2x} = x^2 e^{2x} (2 + 2x) \Leftrightarrow x = 0 \vee x = -\frac{1}{2}$

$x = 0$ geeft raaklijn $y = 0$ (de x -as).

$x = -\frac{1}{2}$ geeft $p = -e^{-1} + \frac{1}{2}e^{-1} = -\frac{1}{2}e^{-1}$, dus de raaklijn is $y = -\frac{1}{2}e^{-1} \cdot x$

Vraag 5a – 4 punten

Op een verticale lijn zijn de x-coördinaten gelijk, dus moet gelden: $x(\pi - a) = x(a)$, en dat klopt:

$$x(\pi - a) = \cos(\pi - a) \sin(2\pi - 2a) = -\cos(a) \sin(-2a) = -\cos(a) \cdot -\sin(2a) = \cos(a) \sin(2a) = x(a)$$

Vraag 5b – 5 punten

$d(P_t, x - as) = |y(t)|$; $d(P_t, y - as) = |x(t)|$. Er moet dus gelden $|y(t)| = 2|x(t)|$.

Dit geeft: $|\cos(t)| = |2 \cos(t) \sin(2t)| \Leftrightarrow |2 \sin(2t)| = 1$

De punten waar $\cos(t) = 0$ laten we immers buiten beschouwing.

$$2 \sin(2t) = 1 \Leftrightarrow \sin(2t) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow 2t = \frac{1}{6}\pi + k \cdot 2\pi \vee 2t = \frac{5}{6}\pi + k \cdot 2\pi \Leftrightarrow t = \frac{1}{12}\pi + k \cdot \pi \vee t = \frac{5}{12}\pi + k \cdot \pi$$

$$2 \sin(2t) = -1$$

$$\Leftrightarrow \sin(2t) = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow 2t = -\frac{1}{6}\pi + k \cdot 2\pi \vee 2t = -\frac{5}{6}\pi + k \cdot 2\pi \Leftrightarrow t = -\frac{1}{12}\pi + k \cdot \pi \vee t = -\frac{5}{12}\pi + k \cdot \pi$$

$$\text{Vierde tijdstip: } t = -\frac{1}{12}\pi + \pi = \frac{11}{12}\pi$$

$$\text{Eerste tijdstip } \frac{1}{12}\pi; \text{ tweede tijdstip } \frac{5}{12}\pi; \text{ derde tijdstip } -\frac{5}{12}\pi + \pi = \frac{7}{12}\pi$$

Vraag 5c – 5 punten

$$\overrightarrow{OP_t} = \begin{pmatrix} x\left(\frac{3}{4}\pi\right) \\ y\left(\frac{3}{4}\pi\right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{3}{4}\pi\right) \cdot \sin\left(1\frac{1}{2}\pi\right) \\ \cos\left(\frac{3}{4}\pi\right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}\sqrt{2} \\ -\frac{1}{2}\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

$$x'(t) = -\sin(t) \cdot \sin(2t) + \cos(t) \cdot 2 \cos(2t), \text{ dus } x'\left(\frac{3}{4}\pi\right) = -\frac{1}{2}\sqrt{2} \cdot -1 + 0 = \frac{1}{2}\sqrt{2}$$

$$y'(t) = -\sin(t), \text{ dus } y'\left(\frac{3}{4}\pi\right) = -\frac{1}{2}\sqrt{2}$$

$$\text{Zo zien we } \vec{v} = \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}\sqrt{2} \\ -\frac{1}{2}\sqrt{2} \end{pmatrix} = \overrightarrow{OP_t}$$

Vraag 6a – 5 punten

$$g_p(x) = \frac{x^2 - 5x + 6}{2x - p} \Rightarrow g'_p(x) = \frac{(2x - 5)(2x - p) - (x^2 - 5x + 6) \cdot 2}{(2x - p)^2} \Rightarrow g'_p(2) = \frac{-(4 - p) - 0}{(4 - p)^2} = \frac{1}{p - 4}$$

De helling van $y = \frac{1}{4}x^2 - 1$ in $(2,0)$ is $\frac{1}{4} \cdot 2 \cdot 2 = 1$

Er moet dus gelden $\frac{1}{p-4} = 1 \Leftrightarrow p - 4 = 1 \Leftrightarrow p = 5$

Vraag 6b – 5 punten

$$g_8(x) = \frac{x^2 - 5x + 6}{2x - 8}$$

$2x - 8 = 0 \Leftrightarrow x = 4$; voor $x = 4$ is de teller niet nul, dus verticale asymptoot $x = 4$.

$$\frac{x^2 - 5x + 6}{2x - 8} = \frac{x^2 - 4x - x + 6}{2x - 8} = \frac{x^2 - 4x}{2x - 8} + \frac{-x + 4}{2x - 8} + \frac{2}{2x - 8} = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} + \frac{2}{2x - 8}$$

De scheve asymptoot is dus $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$.

Extra vraag:

Voor $x \neq 2$ geldt $g_4(x) = \frac{(x-2)(x-3)}{(2x-4)} = \frac{1}{2}(x-3)$.

De grafiek is dus de lijn $y = \frac{1}{2}(x-3)$ met perforatie in $(2, -\frac{1}{2})$.

Voor $x \neq 3$ geldt $g_6(x) = \frac{(x-2)(x-3)}{(2x-6)} = \frac{1}{2}(x-2)$.

De grafiek is dus de lijn $y = \frac{1}{2}(x-2)$ met perforatie in $(3, \frac{1}{2})$.

Extra vraag 1a – 6 punten

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{9-2x}} \cdot -2 = -\frac{1}{\sqrt{9-2x}} \Rightarrow f'(0) = -\frac{1}{3}$$

$$f(0) = 3, \text{ een vergelijking van de raaklijn is dus } y = -\frac{1}{3}x + 3$$

$$\text{Snijpunt met x-as: } x = 9$$

$$\text{Oppervlakte driehoek: } \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 9 = 13\frac{1}{2}$$

Extra vraag 1b – 6 punten

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow 9 - 2x = 0 \Leftrightarrow x = 4\frac{1}{2}; \text{ te berekenen is dus } \int_0^{4,5} f(x) \, dx$$

$$\text{De primitieve heeft de vorm } F(x) = a(9 - 2x)^{\frac{3}{2}} \text{ met } a = \frac{1}{3/2} \cdot \frac{1}{-2} = -\frac{1}{3}$$

$$F(0) = -\frac{1}{3} \cdot 9^{\frac{3}{2}} = -9; F\left(4\frac{1}{2}\right) = 0; \text{ de oppervlakte is dus } 0 - (-9) = 9$$

Extra vraag 1c – 5 punten

$$f(x) = g(x) \Leftrightarrow \sqrt{9-2x} = 2x + 11 \Rightarrow 9 - 2x = (2x + 11)^2 \Leftrightarrow 9 - 2x = 4x^2 + 44x + 121$$

$$\Leftrightarrow 4x^2 + 46x + 112 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-46 + \sqrt{324}}{8} = \frac{-46 + 18}{8} = -3\frac{1}{2} \vee x = \frac{-46 - 18}{8} = -8$$

Alleen $x = -3\frac{1}{2}$ voldoet

Extra vraag 2a – 7 punten

$$f(x) = g(x) \Leftrightarrow \cos(2x) = \sin\left(2x - \frac{1}{6}\pi\right) \Leftrightarrow \cos(2x) = \cos\left(2x - \frac{1}{6}\pi - \frac{1}{2}\pi\right) \Leftrightarrow \cos(2x) = \cos\left(2x - \frac{2}{3}\pi\right)$$

De vergelijking kan ook omgezet worden naar $\sin\left(2x + \frac{1}{2}\pi\right) = \sin\left(2x - \frac{1}{6}\pi\right)$

Dit geeft $2x = -2x + \frac{2}{3}\pi + k \cdot 2\pi \Leftrightarrow 4x = \frac{2}{3}\pi + k \cdot 2\pi \Leftrightarrow x = \frac{1}{6}\pi + k \cdot \frac{1}{2}\pi$

Oplossingen op het interval $[-\pi, \pi]$: $x = \frac{1}{6}\pi$; $x = \frac{2}{3}\pi$; $x = -\frac{1}{3}\pi$; $x = -\frac{5}{6}\pi$

Extra vraag 2b – 7 punten

$f(x) = \sin^2(x) + \cos(2x)$ direct differentiëren geeft

$$f'(x) = 2 \sin(x) \cos(x) - 2 \sin(2x) = \sin(2x) - 2 \sin(2x) = -\sin(2x)$$

of $f'(x) = 2 \sin(x) \cos(x) - 2 \sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x) - 2 \cdot 2 \sin(x) \cos(x) = -2 \sin(x) \cos(x)$

Je kunt $f(x)$ ook eerst omzetten:

$$f(x) = \sin^2(x) + \cos(2x) = \sin^2(x) + \cos^2(x) - \sin^2(x) = \cos^2(x) \text{ geeft ook } f'(x) = -2 \sin(x) \cos(x)$$

In alle gevallen volgt $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0 + k \cdot \frac{1}{2}\pi$

Maxima voor $x = 0 (+k \cdot \pi)$: $f(0) = 1$

Minima voor $x = \frac{1}{2}\pi (+k \cdot \pi)$: $f\left(\frac{1}{2}\pi\right) = 0$

Extra vraag 2c – 4 punten

Eenzijds geldt:

$$\begin{aligned} h(x) &= f(x) + g(x) + 2 \cos^2(x) - 2 = \sin^2(x) + \cos(2x) + \sin^2(x) + \sin\left(2x - \frac{1}{6}\pi\right) + 2 \cos^2(x) - 2 \\ &= \cos(2x) + \sin\left(2x - \frac{1}{6}\pi\right) + 2(\sin^2(x) + \cos^2(x)) - 2 = \cos(2x) + \sin\left(2x - \frac{1}{6}\pi\right) \\ &= \cos(2x) + \sin(2x) \cos\left(\frac{1}{6}\pi\right) - \cos(2x) \sin\left(\frac{1}{6}\pi\right) = \frac{1}{2} \cos(2x) - \frac{1}{2} \sqrt{3} \cdot \sin(2x) \end{aligned}$$

Anderzijds geldt: $\sin\left(2x + \frac{1}{6}\pi\right) = \sin(2x) \cos\left(\frac{1}{6}\pi\right) + \cos(2x) \cdot \sin\left(\frac{1}{6}\pi\right) = -\frac{1}{2} \sqrt{3} \cdot \sin(2x) + \frac{1}{2} \cos(2x)$

Extra vraag 2d – 4 punten

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\left(2x + \frac{1}{6}\pi\right) dx = \left[-\frac{1}{2} \cos\left(2x + \frac{1}{6}\pi\right)\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{1}{2} \cos\left(1\frac{1}{6}\pi\right) + \frac{1}{2} \cos\left(\frac{1}{6}\pi\right) = -\frac{1}{2} \cdot -\frac{1}{2} \sqrt{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \sqrt{3} = \frac{1}{2} \sqrt{3}$$